

# ARITHMÉTIQUE DES ENTIERS RELATIFS

## 1 DIVISIBILITÉ ET DIVISION ENTIÈRES

### 1.1 RELATION DE DIVISIBILITÉ

#### Définition (Divisibilité, diviseur, multiple)

- Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . On dit que  $a$  divise  $b$ , ou que  $a$  est un diviseur de  $b$ , ou que  $b$  est divisible par  $a$ , ou que  $b$  est un multiple de  $a$ , s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  pour lequel :  $b = ak$ . Cette relation se note :  $a|b$ .
- Pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ , l'ensemble des multiples de  $a$  n'est autre que l'ensemble :  $a\mathbb{Z} = \{ak\}_{k \in \mathbb{Z}}$ .  
Quant à l'ensemble des diviseurs de  $a$ , il sera noté  $\text{div}(a)$  dans ce cours, mais il ne s'agit pas d'une notation universelle. Deux remarques en passant :  $\max \text{div}(a) = |a|$  et  $\text{div}(a) = \text{div}(|a|)$ .

🐰 **Explication** 🐰 Ayez toujours en tête que pour tous  $a, b \in \mathbb{N}^*$  — on exclut 0, attention :

$$a|b \implies a \leq b.$$

**Exemple**  $\text{div}(8) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$  et  $\text{div}(12) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$ .

#### Théorème (Propriétés de la relation de divisibilité) Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ .

(i) La relation de divisibilité  $|$  est une relation d'ordre sur  $\mathbb{N}$  MAIS elle est seulement réflexive et transitive sur  $\mathbb{Z}$  car :

$$a|b \text{ et } b|a \iff |a| = |b| \iff a = b \text{ ou } a = -b.$$

(ii) Si :  $d|a$  et  $d|b$ , alors :  $d|(au + bv)$  pour tous  $u, v \in \mathbb{Z}$ .

(iii) Si :  $a|b$  et  $c|d$ , alors :  $ac|bd$ . En particulier, si :  $a|b$ , alors :  $a^k|b^k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

🐰 **Explication** 🐰 Que peut-on dire de  $a$  et  $b$  quand on sait qu'ils ont les mêmes diviseurs, i.e. :  $\text{div}(a) = \text{div}(b)$  ? Dans ce cas, en particulier :  $a|b$  et  $b|a$ , donc :  $|a| = |b|$  d'après (i).

#### Démonstration

(i) Par hypothèse :  $b = ak$  et  $a = bl$  pour certains  $k, l \in \mathbb{Z}$ , donc :  $b = bkl$ .

— Si  $b = 0$  :  $a = bl = 0$  donc :  $|a| = |b|$ .

— Si  $b \neq 0$  :  $kl = 1$ , donc soit :  $k = l = 1$ , soit :  $k = l = -1$ , i.e. soit :  $a = b$ , soit :  $a = -b$ , i.e. :  $|a| = |b|$ .

(ii) Par hypothèse :  $a = dk$  et  $b = dl$  pour certains  $k, l \in \mathbb{Z}$ , donc :  $au + bv = d(ku + vl)$  avec :  $ku + vl \in \mathbb{Z}$  pour tous  $u, v \in \mathbb{Z}$ , donc enfin :  $d|(au + bv)$ .

(iii) Par hypothèse :  $b = ak$  et  $d = cl$  pour certains  $k, l \in \mathbb{Z}$ , donc :  $bd = (ac)(kl)$  avec :  $kl \in \mathbb{Z}$ , et ainsi :  $ac|bd$ . ■

### 1.2 RELATION DE CONGRUENCE MODULO UN ENTIER

**Définition (Relation de congruence modulo un entier)** Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $a, b \in \mathbb{Z}$ . On dit que  $a$  est congru à  $b$  modulo  $n$  si :  $n|(b - a)$ , i.e. s'il existe un entier  $k \in \mathbb{Z}$  pour lequel :  $a = b + kn$ . Cette relation se note :  $a \equiv b [n]$ .

🦋 **Explication** 🦋 Les relations de congruence généralisent la relation de divisibilité :

$$n|a \iff a \equiv 0 [n].$$

Cette petite équivalence est fondamentale dans les deux sens. Grâce à elle, on peut passer du vocabulaire de la divisibilité à celui des congruences et réciproquement.

**Théorème (Propriétés de la relation de congruence modulo un entier)** Soient  $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$  et  $m, n \in \mathbb{N}$ .

- (i) La relation  $\equiv [n]$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ .
- (ii) **Somme** : Si :  $a \equiv b [n]$  et  $a' \equiv b' [n]$ , alors :  $a + a' \equiv b + b' [n]$ .
- (iii) **Produit** : Si :  $a \equiv b [n]$  et  $a' \equiv b' [n]$ , alors :  $aa' \equiv bb' [n]$ .  
En particulier, si :  $a \equiv b [n]$ , alors :  $a^k \equiv b^k [n]$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .
- (iv) **Multiplication/division par un entier non nul** : Si  $m \neq 0$  :  $a \equiv b [n] \iff ma \equiv mb [mn]$ .

**Démonstration** L'assertion (i) a été prouvée au chapitre « Relations binaires ».

(ii) Par hypothèse,  $n$  divise  $b - a$  et  $b' - a'$ , donc aussi  $(b + b') - (a + a')$  par somme, donc :  $a + a' \equiv b + b' [n]$ .

(iii) Remarque :  $bb' - aa' = b(b' - a') + a'(b - a)$ . Or par hypothèse,  $n$  divise  $b - a$  et  $b' - a'$ , donc aussi  $b(b' - a') + a'(b - a) = bb' - aa'$ , donc :  $aa' \equiv bb' [n]$ .

(iv) Enfin :  $a \equiv b [n] \iff n|(b - a) \xrightarrow{m \neq 0} mn|m(b - a) \iff ma \equiv mb [mn]$ . ■

**Exemple**  $2^{345} + 5^{432}$  est divisible par 3.

**Démonstration**  $2^{345} + 5^{432} \equiv (-1)^{345} + (-1)^{432} \equiv -1 + 1 \equiv 0 [3]$ .

**Exemple** Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$  impair :  $n^2 \equiv 1 [8]$ .

**Démonstration** Soit  $n \in \mathbb{Z}$  impair, disons :  $n = 2k + 1$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$ .

Alors :  $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$ . Or  $k$  ou  $k + 1$  est pair car ces deux entiers sont consécutifs, donc  $k(k + 1)$  est pair aussi :  $k(k + 1) \equiv 0 [2]$ . A fortiori :  $4k(k + 1) \equiv 0 [8]$ , et enfin :  $n = 4k(k + 1) + 1 \equiv 1 [8]$ .

### 1.3 INTRODUCTION AUX NOMBRES PREMIERS

**Définition (Nombre premier, nombre composé)** Soit  $p \in \mathbb{N}$ . On dit que  $p$  est *premier* si :  $p \neq 1$  et si les seuls diviseurs positifs de  $p$  sont 1 et  $p$ . On dit que  $p$  est *composé* si :  $p \neq 1$  et si  $p$  n'est pas premier.

L'ensemble des nombres premiers est parfois noté  $\mathbb{P}$ .

🦋 **Explication** 🦋 Il n'est pas inutile de connaître la liste des premiers nombres premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37... Nous étudierons plus loin un procédé mécanique — mais coûteux — pour les déterminer tous.

Le résultat suivant est un théorème d'EXISTENCE facile à démontrer. Nous aurons plus tard un théorème d'UNICITÉ, mais nettement plus difficile à obtenir.

**Théorème (Existence de la factorisation première)** Tout entier naturel non nul est un produit de nombres premiers.

🦋 **Explication** 🦋 Dans cet énoncé lapidaire, on considère 1 comme le produit de 0 nombre premier et tout nombre premier comme le produit d'1 nombre premier — soi-même.

**Démonstration** Par récurrence forte.

- **Initialisation** : 1 n'est divisible par aucun nombre premier, c'est le produit de zéro d'entre eux.

- **Hérédité** : Soit  $n \geq 2$ . Faisons l'hypothèse que tout entier naturel non nul strictement inférieur à  $n$  est un produit de nombres premiers. Qu'en est-il de  $n$  ? Deux cas possibles — soit  $n$  est premier, soit  $n$  est composé. Si  $n$  est premier, c'est terminé, il est produit de nombres premiers. Et s'il est composé ? Il s'écrit dans ce cas :  $n = ab$  où  $a$  et  $b$  sont deux diviseurs positifs de  $n$  autres que 1 et  $n$ . Par hypothèse de récurrence,  $a$  et  $b$  sont des produits de nombres premiers, donc  $n$  aussi par produit. ■

**Théorème (Infinité de l'ensemble des nombres premiers)** L'ensemble  $\mathbb{P}$  des nombres premiers est infini.

**Démonstration** Raisonnons par l'absurde en supposant  $\mathbb{P}$  fini et notons donc  $p_1, \dots, p_r$  la liste COMPLÈTE des nombres premiers. Posons ensuite :  $N = p_1 \dots p_r + 1$ . Cet entier  $N$ , au moins égal à 2, est un produit de nombres premiers d'après le théorème précédent, donc divisible par  $p_k$  pour un certain  $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ . En particulier,  $p_k$  divise  $N - p_1 \dots p_r = 1$ , i.e. :  $p_k = 1$  — contradiction. ■

🦋 **Explication** 🦋 **(Crible d'Ératosthène)** Le *crible d'Ératosthène* permet une détermination simple de tous les nombres premiers inférieurs à un seuil donné et repose sur la remarque suivante. Si un entier  $n \in \mathbb{N}^*$  est composé et si nous notons  $p$  le plus petit de ses diviseurs premiers, alors :  $n = pk$  pour un certain  $k \in \mathbb{N}^*$ , mais comme alors tout diviseur premier de  $k$  est supérieur ou égal à  $p$ , en particulier  $k \geq p$ , et donc :  $n = pk \geq p^2$ , i.e. :  $p \leq \sqrt{n}$ . En résumé :

Tout entier COMPOSÉ  $n \in \mathbb{N}^*$  possède un diviseur premier inférieur ou égal à  $\sqrt{n}$ .

Nous pouvons en déduire la liste de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. On part d'une liste des entiers de 2 à 100, dont on va peu à peu rayer les entiers composés et dont ne resteront vierges à la fin que les nombres premiers.

- L'entier 2 est premier, c'est notre point de départ. On raje tous ses multiples hormis lui-même, car ceux-ci sont composés.
- Le premier entier non rayé est alors 3. Il est forcément premier car s'il était composé, il aurait un diviseur premier strictement inférieur — ici 2 — et on l'aurait déjà rayé. On raje tous les multiples de 3 hormis lui-même, car ceux-ci sont composés.
- Même chose avec 5, même chose avec 7. Le premier entier non rayé est alors 11. Or tout entier compris entre 2 et 100 possède un diviseur premier inférieur ou égal à  $\sqrt{100} = 10$ , donc en fait en rayant les entiers que nous avons rayés, nous avons rayés tous les entiers composés compris entre 2 et 100. Les entiers non rayés restants sont exactement tous les nombres premiers de la liste étudiée.

	<b>2</b>	<b>3</b>	4	<b>5</b>	6	<b>7</b>	8	9	10
<b>11</b>	12	<b>13</b>	14	15	16	<b>17</b>	18	<b>19</b>	20
21	22	<b>23</b>	24	25	26	27	28	<b>29</b>	30
<b>31</b>	32	33	34	35	36	<b>37</b>	38	39	40
<b>41</b>	42	<b>43</b>	44	45	46	<b>47</b>	48	49	50
51	52	<b>53</b>	54	55	56	57	58	<b>59</b>	60
<b>61</b>	62	63	64	65	66	<b>67</b>	68	69	70
<b>71</b>	72	<b>73</b>	74	75	76	77	78	<b>79</b>	80
81	82	<b>83</b>	84	85	86	87	88	<b>89</b>	90
91	92	93	94	95	96	<b>97</b>	98	99	100

## 1.4 DIVISION EUCLIDIENNE

**Théorème (Théorème de la division euclidienne)** Soient  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$ . Il existe un et un seul couple  $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  pour lequel :  $a = bq + r$  et  $0 \leq r \leq b - 1$  (ou encore :  $0 \leq r < b$ ). On appelle  $a$  le *dividende* de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ ,  $b$  son *diviseur*,  $q$  son *quotient* et  $r$  son *reste*. Par ailleurs :  $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$  et  $r \equiv a [b]$ .

🦋 **Explication** 🦋

- Le théorème de la division euclidienne est un résultat d'EXISTENCE et d'UNICITÉ, voilà l'essentiel.
- On peut reformuler ce théorème en termes de congruences :  $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists ! r \in \llbracket 0, b - 1 \rrbracket / a \equiv r [b]$ . Cette proposition affirme simplement que tout entier relatif  $a$  est congru modulo  $b$  à un unique entier  $r$  COMPRIS ENTRE 0 ET  $b - 1$ . L'ensemble quotient de  $\mathbb{Z}$  par la relation  $\equiv [b]$  est donc l'ensemble  $\{b\mathbb{Z}, b\mathbb{Z} + 1, \dots, b\mathbb{Z} + b - 1\}$  à  $b$  éléments noté généralement  $\frac{\mathbb{Z}}{b\mathbb{Z}}$ . Par exemple, on peut ramener  $a = 433$  à l'un des entiers 0, 1, 2, 3 ou 4 modulo  $b = 5$ . Précisément :  $\underbrace{433}_a = \underbrace{5}_b \times \underbrace{86}_q + \underbrace{3}_r$ , donc :  $433 \equiv 3 [5]$ .

### Démonstration

- **Existence** : L'idée de la preuve est simple. Si  $a$  est positif, on lui retranche  $b$  une fois, deux fois, trois fois... jusqu'à ce que  $a$  ait presque complètement fondu, c'est-à-dire jusqu'au moment où le résultat est compris entre 0 et  $b - 1$ . Si  $a$  est négatif, on fait pareil mais en ajoutant  $b$  au lieu de le retrancher.

L'ensemble  $\mathcal{D} = (a + b\mathbb{Z}) \cap \mathbb{N}$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$  car il contient  $a = a - b \times 0$  si :  $a \geq 0$  et  $a - ba$  si :  $a < 0$ . Cet ensemble possède ainsi un plus petit élément  $r$ , et par définition de  $\mathcal{D}$  :  $a = bq + r$  pour un certain  $q \in \mathbb{Z}$ . Se peut-il qu'on ait :  $r \geq b$  ? Si c'était le cas,  $a - b(q + 1) = r - b$  serait un élément de  $\mathcal{D}$  strictement plus petit que  $r = \min \mathcal{D}$  — impossible. Conclusion :  $0 \leq r \leq b - 1$ .

- **Unicité** : Soient  $(q, r)$  et  $(q', r')$  deux couples de division euclidienne de  $a$  par  $b$ . Alors :  $|r' - r| < b$ , mais par ailleurs :  $b(q - q') = r' - r$ , donc :  $b|q - q'| = |r' - r| < b$ , et enfin :  $|q - q'| < 1$ . Or  $q - q'$  est un entier, donc :  $q = q'$ , et aussitôt :  $r = a - bq = a - bq' = r'$ .
- Pour finir, comme :  $0 \leq r = a - bq < b$ , alors :  $\frac{a}{b} - 1 < q \leq \frac{a}{b}$ , donc en effet :  $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ . ■

**En pratique** (Algorithme de la division euclidienne) On vient de le voir, le couple  $(q, r)$  de la division euclidienne de  $a$  par  $b$  se calcule à partir de  $a$  par une série d'additions/soustractions, mais pour diviser 1000 par 3, sommes-nous vraiment obligés d'effectuer 333 soustractions ? Oui et non.

Tâchons de le comprendre sur la division de 347 par 5. Dans un premier temps, on retranche en apparence  $6 \times 5 = 30$  de 34, mais en fait on retranche  $60 \times 5 = 300$  de 347 puisque le « 6 » apparaît comme chiffre des dizaines dans le quotient. Dans un second temps, on retranche  $9 \times 5 = 45$  de 47. Au total, on a donc effectué 69 soustractions mais en deux fois seulement — d'abord 60, puis 9. Le reste obtenu est 2.

$$\begin{array}{r|l} 3 & 4 & 7 & 5 \\ - 3 & 0 & (0) & 6 & 9 \\ \hline & 4 & 7 & & \\ - 4 & 5 & & & \\ \hline & & & & 2 \end{array}$$

Conclusion : DIVISER, C'EST SOUSTRAIRE. Pour un ordinateur, un grand nombre de soustractions n'est pas un problème. Pour nous autres cerveaux c'en est un. Nous compensons en apprenant et en utilisant les tables de multiplication, car ça nous le faisons vite et bien. C'est grâce aux tables de multiplication que nous avons trouvé les chiffres « 6 » et « 9 » du quotient dans l'exemple précédent.

**Exemple** Soient  $x, y, z \in \mathbb{Z}$  trois entiers solutions de l'équation de Fermat :  $x^3 + y^3 = z^3$ . Alors l'un des entiers  $x, y$  ou  $z$  est divisible par 3.

**Démonstration** Supposons par l'absurde que ni  $x$  ni  $y$  ni  $z$  n'est divisible par 3. Le reste de la division euclidienne de  $x$  par 9 est alors l'un des entiers 1, 2, 4, 5, 7, 8 — on peut rejeter les cas 0, 3 et 6. Le tableau ci-contre montre que :  $x^3 \equiv \pm 1 [9]$ . On montrerait de même que :  $y^3 \equiv \pm 1 [9]$  et  $z^3 \equiv \pm 1 [9]$ .

$x [9]$	$x^2 [9]$	$x^3 [9]$
1	1	1
2	4	$8 \equiv -1$
4	$16 \equiv -2$	$-8 \equiv 1$
$5 \equiv -4$	$16 \equiv -2$	$8 \equiv -1$
$7 \equiv -2$	4	$-8 \equiv 1$
$8 \equiv -1$	1	-1

Or par hypothèse :  $x^3 + y^3 \equiv z^3 [9]$ . À gauche, on a modulo 9 soit :  $1 + 1 = 2$ , soit :  $1 - 1 = 0$ , soit :  $-1 + 1 = 0$ , soit :  $-1 - 1 = -2$ , et à droite :  $\pm 1$ . Impossible !

**Exemple** Le reste de la division euclidienne de  $2^{65362}$  par 7 est 2.

**Démonstration** La démonstration de ce résultat est TRÈS longue si on applique l'algorithme précédent comme un rustre, car l'entier  $2^{65362}$  possède près de 20000 décimales. Or on remarque que :  $2^3 \equiv 8 \equiv 1 [7]$ . C'est l'idée-phare de cet exemple — dénicher, si elle existe, la première puissance de 2 congrue à 1 modulo 7.

On divise alors 65362 par 3 :  $65362 = 3 \times 21787 + 1$ . Aussitôt :  $2^{65362} \equiv (2^3)^{21787} \times 2^1 \equiv 1^{21787} \times 2 \equiv 2 [7]$ .

## 2 PGCD, PPCM

**Définition (Diviseur/multiple commun)** Soient  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

- On appelle *diviseur commun* de  $a_1, \dots, a_r$  tout entier relatif qui divise à la fois  $a_1, \dots, a_r$ .
- On appelle *multiple commun* de  $a_1, \dots, a_r$  tout entier relatif divisible à la fois par  $a_1, \dots, a_r$ .

**Exemple** Les diviseurs communs de 12 et 18 sont  $\pm 1, \pm 2, \pm 3$  et  $\pm 6$  car :

$$\operatorname{div}(12) \cap \operatorname{div}(18) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\} \cap \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18\} = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}.$$

Les multiples communs de 12 et 18 sont tous les multiples de 36 :  $12\mathbb{Z} \cap 18\mathbb{Z} = 36\mathbb{Z}$ , mais nous ne chercherons pas à le justifier pour le moment.

## 2.1 PGCD DE DEUX ENTIERS

### Définition-théorème (PGCD de deux entiers)

- Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  avec :  $a \neq 0$  ou  $b \neq 0$ . On appelle *plus grand commun diviseur* (ou *PGCD*) de  $a$  et  $b$  et on note  $a \wedge b$  le plus grand élément au sens de la relation  $\leq$  de l'ensemble des diviseurs communs de  $a$  et  $b$ .

En résumé :  $a \wedge b = \max(\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b))$ .

- On pose enfin :  $0 \wedge 0 = 0$ .

**Démonstration** Pour justifier l'existence de  $a \wedge b$  dans le cas où :  $a \neq 0$ , remarquons simplement que l'ensemble des diviseurs communs de  $a$  et  $b$  contient 1 et est majoré par  $|a|$ . Cet ensemble est donc une partie non vide majorée de  $\mathbb{Z}$ , donc possède un plus grand élément. ■

**Exemple**  $12 \wedge 18 = 6$  car d'après l'exemple précédent :  $\operatorname{div}(12) \cap \operatorname{div}(18) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ .

**Exemple** Pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$  :  $a \wedge b = |a| \wedge |b|$ ,  $a \wedge b = b \wedge a$ ,  $a \wedge 1 = 1$  et  $a \wedge 0 = |a|$ .

**Démonstration** Pour  $(a, b) \neq (0, 0)$  :  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(|a|) \cap \operatorname{div}(|b|)$ ,  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(b) \cap \operatorname{div}(a)$ ,  
 $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(1) = \operatorname{div}(a) \cap \{\pm 1\} = \{\pm 1\}$  et  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(0) = \operatorname{div}(a) \cap \mathbb{Z} = \operatorname{div}(a)$ .

**Théorème (Idée fondamentale de l'algorithme d'Euclide)** Pour tous  $a, b, k \in \mathbb{Z}$  :  $a \wedge b = (a + bk) \wedge b$ .

✂ **Explication** ✂ En particulier, pour tous  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$ , si on note  $r$  le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$  :  $a \wedge b = b \wedge r$ , et la preuve ci-dessous montre en passant que :  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(b) \cap \operatorname{div}(r)$ .

**Démonstration** Tout diviseur commun de  $a$  et  $b$  divise aussi  $a + bk$  et  $b$ , et inversement, tout diviseur commun de  $a + bk$  et  $b$  divise aussi  $a = (a + bk) - bk$  et  $b$ . Conclusion :  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(a + bk) \cap \operatorname{div}(b)$ . Le résultat demandé est dès lors établi dans le cas où :  $b \neq 0$  car ces deux intersections ont le même maximum, et il est évident par ailleurs quand :  $b = 0$ . ■

**Exemple** Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$  :  $(3n + 1) \wedge (2n + 5) = \begin{cases} 13 & \text{si } n \equiv 4 [13] \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$

**Démonstration**  $(3n + 1) \wedge (2n + 5) = ((3n + 1) - (2n + 5)) \wedge (2n + 5) = (n - 4) \wedge (2n + 5)$   
 $= (n - 4) \wedge ((2n + 5) - 2(n - 4)) = (n - 4) \wedge 13$

**Théorème (Diviseurs communs et diviseurs du PGCD pour deux entiers)** Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Les diviseurs communs de  $a$  et  $b$  sont exactement les diviseurs de  $a \wedge b$  :  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(a \wedge b)$ .

**Démonstration** Nous allons mettre en œuvre dans cette preuve un algorithme de calcul du PGCD qu'on appelle l'*algorithme d'Euclide*.

- **Algorithme d'Euclide** : Soient  $a, b \in \mathbb{N}$  tels que :  $0 \leq b \leq a$ . On définit une suite d'entiers naturels  $r_0, r_1, r_2, \dots$  de la manière suivante.  
 — Au départ, on pose :  $r_0 = a$  et  $r_1 = b$ .



— Ensuite, pour  $k \in \mathbb{N}$ , TANT QUE :  $r_{k+1} \neq 0$ , on note  $r_{k+2}$  le reste de la division euclidienne de  $r_k$  par  $r_{k+1}$  — en particulier :  $r_{k+2} < r_{k+1}$ .

À l'issue de cette construction :  $r_0 \geq r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ , et comme il n'existe qu'un nombre FINI d'entiers naturels entre 0 et  $r_0$ , on obtient forcément :  $r_N = 0$  pour un certain  $N \in \mathbb{N}^*$  — l'algorithme se termine. Or, en vertu de l'idée fondamentale de l'algorithme d'Euclide :

$$a \wedge b = r_0 \wedge r_1 = r_1 \wedge r_2 = \dots = r_{N-1} \wedge r_N = r_{N-1} \wedge 0 = r_{N-1}$$

$$\begin{aligned} \text{et : } \quad \text{div}(a) \cap \text{div}(b) &= \text{div}(r_0) \cap \text{div}(r_1) = \text{div}(r_1) \cap \text{div}(r_2) = \dots = \text{div}(r_{N-1}) \cap \text{div}(r_N) \\ &= \text{div}(r_{N-1}) \cap \text{div}(0) = \text{div}(r_{N-1}) \cap \mathbb{Z} = \text{div}(r_{N-1}) = \text{div}(a \wedge b). \end{aligned}$$

- **Extension au cas général** : Dans le cas général de deux entiers  $a$  et  $b$  quelconques, on se ramène au cas où :  $0 \leq b \leq a$  de la manière suivante. On peut supposer  $a$  et  $b$  positifs car :  $a \wedge b = |a| \wedge |b|$ , et on peut supposer :  $b \leq a$  car :  $a \wedge b = b \wedge a$ . ■

 **En pratique**  (**Algorithme d'Euclide**) Comme on vient de le voir, l'algorithme d'Euclide est un algorithme de calcul du PGCD de deux entiers relatifs. Dans le cas principal où :  $0 \leq b \leq a$ , il a été montré en particulier que :  $a \wedge b = r_{N-1}$  où  $r_{N-1}$  est le dernier entier non nul de la liste  $r_0, r_1, r_2, \dots$

On retiendra ceci :  $a \wedge b$  est le DERNIER RESTE NON NUL de la suite des restes successifs  $r_0, r_1, r_2, \dots$

**Exemple**  $1542 \wedge 58 = 2$ .

**Démonstration** Il s'agit seulement d'effectuer quelques divisions euclidiennes :  $1542 = 26 \times 58 + 34$ ,

$$58 = 1 \times 34 + 24, \quad 34 = 1 \times 24 + 10, \quad 24 = 2 \times 10 + 4, \quad 10 = 2 \times 4 + 2 \quad \text{et} \quad 4 = 2 \times 2 + 0.$$

 Dernier reste non nul

**Théorème (Relations de Bézout pour deux entiers)** Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Il existe des entiers  $u, v \in \mathbb{Z}$  pour lesquels :  $a \wedge b = au + bv$ . Une telle relation est appelée UNE relation de Bézout de  $a$  et  $b$ .

**✗ ATTENTION ! ✗** Les entiers  $u$  et  $v$  ne sont pas du tout uniques.

Par exemple :  $4 \wedge 6 = 2$ , mais on a à la fois :  $2 = 4 \times (-1) + 6 \times 1$  et  $2 = 4 \times 2 + 6 \times (-1)$ .



**Démonstration** On l'a vu précédemment, on peut toujours se ramener au cas où :  $0 \leq b \leq a$ . On reprend dans cette preuve les restes successifs de l'algorithme d'Euclide en posant :  $r_0 = a$  et  $r_1 = b$  et en notant pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , tant que :  $r_{k+1} \neq 0$ ,  $r_{k+2}$  le reste de la division euclidienne de  $r_k$  par  $r_{k+1}$ . Le quotient de cette division euclidienne sera quant à lui noté  $q_{k+2}$  :  $r_{k+2} = r_k - q_{k+2}r_{k+1}$ . La suite ainsi construite est finie de rang final  $N$  pour lequel :  $r_N = 0$ .

On définit alors deux nouvelles suites  $(u_k)_{0 \leq k \leq N}$  et  $(v_k)_{0 \leq k \leq N}$  par :  $(u_0, v_0) = (1, 0)$ ,  $(u_1, v_1) = (0, 1)$  et pour tout  $k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket$  :  $(u_{k+2}, v_{k+2}) = (u_k - q_{k+2}u_{k+1}, v_k - q_{k+2}v_{k+1})$ . Il n'est alors pas dur de voir par récurrence double que pour tout  $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$  :  $r_k = au_k + bv_k$ .

**Initialisation** :  $r_0 = a = a \times 1 + b \times 0 = au_0 + bv_0$  et  $r_1 = b = a \times 0 + b \times 1 = au_1 + bv_1$ .

**Hérédité** : Soit  $k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket$ . On suppose que :  $r_k = au_k + bv_k$  et  $r_{k+1} = au_{k+1} + bv_{k+1}$ . Aussitôt :  $r_{k+2} = r_k - q_{k+2}r_{k+1} \stackrel{\text{HDR}}{=} (au_k + bv_k) - q_{k+2}(au_{k+1} + bv_{k+1}) = a(u_k - q_{k+2}u_{k+1}) + b(v_k - q_{k+2}v_{k+1}) = au_{k+2} + bv_{k+2}$ .

Comme voulu, en particulier :  $a \wedge b = r_{N-1} = au_{N-1} + bv_{N-1}$ . ■

 **En pratique**  (**Algorithme d'Euclide étendu**) Le procédé de construction des entiers  $u$  et  $v$  de la démonstration qui précède s'appelle l'algorithme d'Euclide étendu. En résumé, alors que l'algorithme d'Euclide ne s'intéresse qu'aux restes des divisions euclidiennes successives effectuées, l'algorithme d'Euclide étendu va plus loin en tenant compte aussi des quotients successifs obtenus. Un tableau bien présenté facilite grandement les calculs.

Il faut bien retenir ici l'idée principale de l'algorithme. Les entiers  $u_k$  et  $v_k$  sont construits de proche en proche avec un seul et unique souci — maintenir vraie l'égalité :  $r_k = au_k + bv_k$ . Ensuite, on passe de  $r_k$  et  $r_{k+1}$  à  $r_{k+2}$  grâce à la relation :

$r_{k+2} = r_k - q_{k+2}r_{k+1}$  et le même calcul permet de passer de  $u_k$  et  $u_{k+1}$  à  $u_{k+2}$  (resp.  $v_k$  et  $v_{k+1}$  à  $v_{k+2}$ ) :  $u_{k+2} = u_k - q_{k+2}u_{k+1}$  (resp.  $v_{k+2} = v_k - q_{k+2}v_{k+1}$ ).

Les colonnes «  $r_k$  »  
et «  $q_k$  » sont remplies  
selon les règles de division  
de l'algorithme d'Euclide simple.

$k$	$q_k$	$r_k = au_k + bv_k$	$u_k$	$v_k$
0		$a$ $\div$ $b$	1	0
1			0	1
2	Quotient	Reste		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$N-1$	$q_{N-1}$	$a \wedge b$	$u$	$v$

Les colonnes «  $u_k$  » et «  $v_k$  »  
de l'algorithme étendu  
sont remplies grâce aux relations :

$$u_{k+2} = u_k - q_{k+2}u_{k+1}$$

et

$$v_{k+2} = v_k - q_{k+2}v_{k+1}.$$

Le couple  $(u, v)$  cherché !

Et sur un exemple ? Voyons ce que cela donne sur les entiers 525 et 3080. Le tableau ne contient que 4 lignes car :  $r_5 = 0$ .

$k$	$r_k$	$q_k$	$u_k$	$v_k$
0	3080		1	0
1	525		0	1
2	455	5	1	-5
3	70	1	-1	6
4	35	6	7	-41

Relation de Bézout :

$$3080 \wedge 525 = 35 = 7 \times 3080 - 41 \times 525.$$

**Théorème (Propriétés du PGCD de deux entiers)** Soient  $a, b, c, k \in \mathbb{Z}$ .

- (i) **Associativité** :  $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ .
- (ii) **Factorisation par un diviseur commun** :  $(ak) \wedge (bk) = |k| (a \wedge b)$ .

### Démonstration

- (i)  $\operatorname{div}((a \wedge b) \wedge c) = \operatorname{div}(a \wedge b) \cap \operatorname{div}(c) = \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) \cap \operatorname{div}(c) = \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b \wedge c) = \operatorname{div}(a \wedge (b \wedge c))$ .
- (ii) Nous pouvons supposer :  $k \neq 0$ . Pour commencer :  $|k| (a \wedge b) \in \operatorname{div}(ak) \cap \operatorname{div}(bk) = \operatorname{div}((ak) \wedge (bk))$ , i.e.  $|k| (a \wedge b)$  divise  $(ak) \wedge (bk)$ . Inversement :  $|k| \in \operatorname{div}(ak) \cap \operatorname{div}(bk) = \operatorname{div}((ak) \wedge (bk))$ , donc :  $(ak) \wedge (bk) = |k|d$  pour un certain  $d \in \mathbb{N}$ . Dans ces conditions,  $|k|d$  divise  $ak$  et  $bk$ , donc comme  $k \neq 0$  :  $d \in \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(a \wedge b)$ . En d'autres termes,  $d$  divise  $a \wedge b$ , donc  $(ak) \wedge (bk) = |k|d$  divise  $|k| (a \wedge b)$ . Comme voulu :  $(ak) \wedge (bk) = |k| (a \wedge b)$ . ■

## 2.2 PGCD D'UNE FAMILLE FINIE D'ENTIER

**Définition (PGCD d'une famille finie d'entiers)**

- Soient  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$  des entiers dont l'un au moins est non nul. On appelle *plus grand commun diviseur* (ou *PGCD*) de  $a_1, \dots, a_r$  et on note  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$  le plus grand élément au sens de la relation  $\leq$  de l'ensemble des diviseurs communs de  $a_1, \dots, a_r$ .



En résumé :  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = \max(\operatorname{div}(a_1) \cap \dots \cap \operatorname{div}(a_r))$ .

- On pose enfin pour tout  $r \geq 2$  :  $\overbrace{0 \wedge \dots \wedge 0}^{r \text{ fois}} = 0$ .

**Exemple**  $28 \wedge 42 \wedge 98 = 14$ .

**Démonstration** Il n'est pas dur de vérifier que :  $\operatorname{div}(28) \cap \operatorname{div}(42) \cap \operatorname{div}(98) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14\}$ .



 **En pratique**  En prouvant l'associativité du PGCD de deux entiers, nous avons aussi montré sans le dire que le calcul du PGCD d'une famille finie d'entiers peut être ramené à des calculs de PGCD de deux entiers. Par exemple :

$$10 \wedge 12 \wedge 18 = 10 \wedge (12 \wedge 18) = 10 \wedge 6 = 2, \quad \text{mais aussi, si on préfère :} \quad 10 \wedge 12 \wedge 18 = (10 \wedge 12) \wedge 18 = 2 \wedge 18 = 2.$$



Nous admettrons la généralisation suivante de nos précédents résultats pour gagner du temps.

**Théorème (Reprise des résultats précédents dans le cas d'une famille finie d'entiers)** Soient  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

- Les diviseurs communs de  $a_1, \dots, a_r$  sont exactement les diviseurs de  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$  :

$$\text{div}(a_1) \cap \dots \cap \text{div}(a_r) = \text{div}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r).$$

- Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$  :  $(a_1 k) \wedge \dots \wedge (a_r k) = |k| (a_1 \wedge \dots \wedge a_r)$ .
- Il existe des entiers  $u_1, \dots, u_r \in \mathbb{Z}$  pour lesquels :  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r$ . Une telle relation est appelée **UNE relation de Bézout de  $a_1, \dots, a_r$** .

 **Explication**  La remarque qui suit exploite dans le domaine de l'arithmétique le vocabulaire des relations d'ordre que nous avons développé récemment au chapitre « Relations binaires ». La première chose qu'il faut rappeler, c'est que la relation de divisibilité est une relation d'ordre sur  $\mathbb{N}$  **MAIS PAS SUR  $\mathbb{Z}$** . Pour cette raison, nous ne parlerons ci-dessous que d'entiers naturels. Le mot « diviseur », en particulier, est à comprendre au sens restreint de « diviseur positif », mais nous omettrons la précision « positif » pour alléger. Les lettres  $a, b, a_1, \dots, a_r$  désignent des entiers **NATURELS**.

- Dire que  $a$  **DIVISE**  $b$ , c'est dire que  $a$  est **PLUS PETIT QUE**  $b$  au sens de la divisibilité.
- Les **DIVISEURS COMMUNS POSITIFS** de  $a$  et  $b$  sont exactement les **MINORANTS** de  $\{a, b\}$  au sens de la divisibilité. Pour la même raison, les **MULTIPLES COMMUNS POSITIFS** de  $a$  et  $b$  sont exactement les **MAJORANTS** de  $\{a, b\}$  au sens de la divisibilité.
- Nous avons défini le PGCD de  $a$  et  $b$  comme le plus grand élément de  $\text{div}(a) \cap \text{div}(b)$  au sens de la relation  $\leq$ , mais nous avons vu ensuite que :  $\text{div}(a) \cap \text{div}(b) = \text{div}(a \wedge b)$  — or que signifie cette égalité ? Elle signifie que  $a \wedge b$  est aussi le plus grand élément de  $\text{div}(a) \cap \text{div}(b)$  au sens de la divisibilité. Conclusion :  $a \wedge b$  est le plus grand minorant de  $\{a, b\}$  au sens de la divisibilité, c'est-à-dire sa **BORNE INFÉRIEURE**.

## 2.3 ENTIERS PREMIERS ENTRE EUX



**Définition (Entiers premiers entre eux, cas de deux entiers)** Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . On dit que  $a$  et  $b$  sont *premiers entre eux* si leurs seuls diviseurs communs sont  $\pm 1$ , i.e. si :  $a \wedge b = 1$ .

**Exemple** 6 et 35 sont premiers entre eux car :  $\text{div}(6) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$  et  $\text{div}(35) = \{\pm 1, \pm 5, \pm 7, \pm 35\}$ . Autre manière de voir les choses, un simple calcul de PGCD par l'algorithme d'Euclide montre que :  $6 \wedge 35 = 1$ .

**✗ ATTENTION ! ✗**

Ne confondez pas :  $a \not\wedge b$  et :  $a \wedge b = 1$ .

Par exemple :  $4 \not\wedge 2$ , mais :  $4 \wedge 2 = 2 \neq 1$ .

 **En pratique**  La remarque qui suit est utile dans de très nombreux exercices.

Pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$  de PGCD  $d$  :  $a = da'$  et  $b = db'$  pour certains entiers  $a', b' \in \mathbb{Z}$  **PREMIERS ENTRE EUX**.

Tout simplement, si :  $(a, b) \neq (0, 0)$ , alors :  $d = a \wedge b = (da') \wedge (db') = d(a' \wedge b')$ , donc :  $a' \wedge b' = 1$ .

**Exemple** L'équation :  $x^2 = y^2 + (x \wedge y) + 2$  d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  admet  $(2, 1)$  et  $(2, 0)$  pour seules solutions.

**Démonstration**

- **Analyse** : Soit  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ . On suppose que :  $x^2 = y^2 + (x \wedge y) + 2$  et on pose :  $d = x \wedge y$ . Clairement :  $(x, y) \neq (0, 0)$  donc :  $d \neq 0$ . Nous savons en outre que :  $x = dx'$  et  $y = dy'$  pour certains  $x', y' \in \mathbb{N}$  premiers entre eux.



L'équation devient :  $d^2x'^2 = d^2y'^2 + d + 2$ , de sorte que  $d$  divise 2, donc :  $d = 1$  ou  $d = 2$ .

— **Cas où  $d = 1$**  : Dans ce cas :  $(x' + y')(x' - y') = 3$ . Or 3 est premier et :  $x' - y' \leq x' + y'$ , donc :  $x' + y' = 3$  et  $x' - y' = 1$ . Aussitôt :  $(x', y') = (2, 1)$ , et enfin :  $(x, y) = (2, 1)$ .

— **Cas où  $d = 2$**  : Dans ce cas :  $(x' + y')(x' - y') = 1$ , donc :  $x' + y' = x' - y' = 1$ , i.e. :  $(x', y') = (1, 0)$ , et enfin :  $(x, y) = (2, 0)$ .

- **Synthèse** : Il n'est pas dur de vérifier que les deux couples  $(2, 1)$  et  $(2, 0)$  conviennent en effet.

**Définition (Entiers premiers entre eux dans leur ensemble/deux à deux)** Soient  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

- On dit que  $a_1, \dots, a_r$  sont *premiers entre eux dans leur ensemble* si leurs seuls diviseurs communs sont  $\pm 1$ , i.e. si :  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = 1$ .
- On dit que  $a_1, \dots, a_r$  sont *premiers entre eux deux à deux* si :  $a_i \wedge a_j = 1$  pour tous  $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$  distincts.

✘ ATTENTION ! ✘

Premiers entre eux DEUX À DEUX  $\implies$  Premiers entre eux DANS LEUR ENSEMBLE

mais LA

RÉCIPROQUE EST FAUSSE ! Par exemple, 6, 10 et 15 sont premiers entre eux dans leur ensemble MAIS :  $6 \wedge 10 = 2 \neq 1$ ,  $6 \wedge 15 = 3 \neq 1$  et  $10 \wedge 15 = 5 \neq 1$ .

**Théorème (Théorème de Bézout)** Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i)  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux.      (ii) Il existe deux entiers  $u, v \in \mathbb{Z}$  pour lesquels :  $au + bv = 1$ .

**Démonstration** L'implication (i)  $\implies$  (ii) est une simple relation de Bézout — déjà prouvée. Pour la réciproque (ii)  $\implies$  (i), supposons l'existence de deux entiers  $u, v \in \mathbb{Z}$  pour lesquels :  $au + bv = 1$  et fixons  $d$  un diviseur commun positif de  $a$  et  $b$ . Alors  $d$  divise  $au + bv = 1$ , donc :  $d = 1$ . Comme voulu :  $a \wedge b = 1$ . ■

**Théorème (Théorème de Gauss)** Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ . Si :  $a|bc$  et  $a \wedge b = 1$ , alors :  $a|c$ .

**Démonstration** Par hypothèse :  $bc = ak$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$  et :  $au + bv = 1$  pour certains  $u, v \in \mathbb{Z}$  — relation de Bézout. Multiplions par  $c$  :  $acu + bcv = c$  puis remplaçons  $bc$  par  $ak$  :  $a(cu + kv) = c$ . Comme voulu :  $a|c$ . ■

**Théorème (Entiers premiers entre eux et produit d'entiers)** Soient  $n, a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

- (i) Si chacun des entiers  $a_1, \dots, a_r$  est premier avec  $n$ , leur produit  $a_1 \dots a_r$  l'est aussi.  
 (ii) Si les entiers  $a_1, \dots, a_r$  divisent  $n$  et sont premiers entre eux DEUX À DEUX, leur produit  $a_1 \dots a_r$  divise  $n$ .

✘ ATTENTION ! ✘

- En général, pour  $a, b \in \mathbb{Z}$  :  $a|n$  et  $b|n$   ~~$\implies$~~   $ab|n$ . Par exemple, 12 est divisible par 4 et 6, mais pas par  $4 \times 6 = 24$ .

- Dans l'assertion (ii), il est impératif de supposer  $a_1, \dots, a_r$  premiers entre eux DEUX À DEUX. Par exemple, pour :  $n = 30$ ,  $a_1 = 6$ ,  $a_2 = 10$  et  $a_3 = 15$ , les entiers  $a_1, a_2$  et  $a_3$  divisent  $n$  mais sont seulement premiers entre eux DANS LEUR ENSEMBLE, et clairement leur produit  $a_1 a_2 a_3 = 900$  ne divise pas  $n$ .

**Démonstration** Nous nous contenterons de montrer le résultat dans le cas de deux entiers. On peut le généraliser ensuite par récurrence. Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

- (i) Supposons  $a$  et  $b$  sont premiers avec  $n$ . D'après le théorème de Bézout :  $au + nv = bu' + nv' = 1$  pour certains  $u, v, u', v' \in \mathbb{Z}$ . Aussitôt :  $1 = bu' + nv' = bu'(au + nv) + nv' = (ab)(uu') + n(bvu' + v')$ , donc de nouveau d'après le théorème de Bézout :  $(ab) \wedge n = 1$ .

- (ii) Faisons l'hypothèse que  $a$  et  $b$  divisent  $n$  et sont premiers entre eux. Ainsi :  $n = ak$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$ . En particulier,  $b$  divise  $n = ak$ , or  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss,  $b$  divise  $k$ . A fortiori,  $ab$  divise  $ak = n$ . ■

**Théorème (Forme irréductible d'un rationnel)** Tout rationnel peut être écrit d'une et une seule manière, appelée sa *forme irréductible*, sous la forme  $\frac{p}{q}$  où  $p \in \mathbb{Z}$  et  $q \in \mathbb{N}^*$  avec  $p$  et  $q$  premiers entre eux.

🦋 **Explication** 🦋 En choisissant  $p$  dans  $\mathbb{Z}$  et  $q$  dans  $\mathbb{N}^*$ , on impose que le signe de la fraction soit porté par son numérateur. Sans cela, il n'y aurait pas unicité de la forme irréductible.

### Démonstration

- **Unicité** : Soient  $(p, q), (p', q') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ . On suppose que :  $r = \frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$  avec :  $p \wedge q = 1$  et  $p' \wedge q' = 1$ . Comme  $pq' = p'q$  :  $q|pq'$ . Or :  $p \wedge q = 1$ , donc :  $q|q'$  d'après le théorème de Gauss, puis :  $q'|q$  par symétrie des rôles de  $q$  et  $q'$ . Conclusion :  $|q| = |q'|$ , et comme  $q$  et  $q'$  sont positifs :  $q = q'$ . Divisons enfin l'égalité :  $pq' = p'q$  par  $q = q'$ . Comme voulu :  $p = p'$ .
- **Existence** : Par définition de  $r$  :  $r = \frac{a}{b}$  pour certains  $a, b \in \mathbb{Z}$  avec :  $b \neq 0$ . On peut toujours supposer que  $b$  est positif. Notons  $d$  le PGCD de  $a$  et  $b$ . Alors :  $a = dp$  et  $b = dq$  pour certains  $p \in \mathbb{Z}$  et  $q \in \mathbb{N}^*$  dont nous savons qu'ils sont premiers entre eux. C'est terminé :  $r = \frac{a}{b} = \frac{dp}{dq} = \frac{p}{q}$ . ■

## 2.4 PPCM DE DEUX ENTIERS

### Définition-théorème (PPCM de deux entiers)

- Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  avec :  $a \neq 0$  et  $b \neq 0$ . On appelle *plus petit commun multiple* (ou *PPCM*) de  $a$  et  $b$  et on note  $a \vee b$  le plus petit élément au sens de la relation  $\leq$  de l'ensemble des multiples communs strictement positifs de  $a$  et  $b$ .
- Pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ , on pose :  $a \vee 0 = 0 \vee a = 0$ .

**Démonstration** Pour justifier l'existence de  $a \vee b$  dans le cas où :  $a \neq 0$  et  $b \neq 0$ , remarquons simplement que l'ensemble des multiples communs strictement positifs de  $a$  et  $b$  contient le produit  $|ab|$ , donc est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ , donc possède un plus petit élément. ■

**Exemple** Clairement, pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$  :  $a \vee b = |a| \vee |b|$  et  $a \vee b = b \vee a$ .

### Théorème (Propriétés du PPCM) Soient $a, b, k \in \mathbb{Z}$ .

- Multiples communs et multiples du PPCM** : Les multiples communs de  $a$  et  $b$  sont exactement les multiples de  $a \vee b$  :  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$ .
- Lien avec le PGCD** :  $(a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$ .
- Factorisation par un diviseur commun** :  $(ak) \vee (bk) = |k|(a \vee b)$ .

**Démonstration** Nous pouvons supposer :  $a > 0$  ou  $b > 0$  sans perte de généralité. En particulier :  $a \wedge b \neq 0$ , et nous pouvons nous donner deux entiers  $a', b' \in \mathbb{N}$  premiers entre eux pour lesquels :  $a = (a \wedge b)a'$  et  $b = (a \wedge b)b'$ . Aussitôt :  $\frac{ab}{a \wedge b} = ba' = ab'$ . Nous montrerons simultanément les assertions (i) et (ii).

- Pour commencer,  $a \vee b$  est un multiple de  $a$  et  $b$ , donc tout multiple de  $a \vee b$  est a fortiori lui aussi un multiple de  $a$  et  $b$ . En résumé :  $(a \vee b)\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ .

- Pour l'autre inclusion, soit  $m \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ . Par définition :  $m = au = bv$  pour certains  $u, v \in \mathbb{Z}$ , donc :  $ua' = vb'$  après division par  $a \wedge b \neq 0$ . En particulier :  $a' | vb'$ , mais par ailleurs :  $a' \wedge b' = 1$ , donc :  $a' | v$  d'après le théorème de Gauss, donc :  $v = a'k$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$ .  
Conclusion :  $m = bv = ba'k = k \frac{ab}{a \wedge b}$ , donc :  $m \in \left( \frac{ab}{a \wedge b} \right) \mathbb{Z}$ . En résumé :  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \subset \left( \frac{ab}{a \wedge b} \right) \mathbb{Z}$ .
- Cette inclusion montre en particulier que  $\frac{ab}{a \wedge b}$  divise tout multiple commun strictement positif de  $a$  et  $b$ , donc que  $\frac{ab}{a \wedge b}$  minore l'ensemble des multiples communs strictement positifs de  $a$  et  $b$  au sens de la relation  $\leq$ . Comme  $\frac{ab}{a \wedge b}$  est lui-même un multiple commun strictement positif de  $a$  et  $b$ , alors par définition de  $a \vee b$  :  $a \vee b = \frac{ab}{a \wedge b}$ , ce qui achève aussi de montrer (i). ■

**Exemple** Les multiples communs de 12 et 18 sont tous les multiples de 36.

**Démonstration**  $12 \vee 18 = \frac{12 \times 18}{12 \wedge 18} = \frac{12 \times 18}{6} = 36$ .

🦋 **Explication** 🦋 De même que nous avons pu interpréter le PGCD comme une borne inférieure au sens de la divisibilité sur  $\mathbb{N}$ , nous pouvons dire à présent que pour tous  $a, b \in \mathbb{N}$ , le PPCM de  $a$  et  $b$  n'est autre que le plus petit majorant de l'ensemble  $\{a, b\}$  au sens de la divisibilité, i.e. sa **BORNE SUPÉRIEURE**.

### 3 NOMBRES PREMIERS

#### 3.1 VALUATIONS $p$ -ADIQUES ET FACTORISATION PREMIÈRE

**Définition-théorème (Valuation  $p$ -adique)** Soient  $p \in \mathbb{P}$  et  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . L'ensemble  $\{k \in \mathbb{N} / p^k | n\}$  possède un plus grand élément, appelé la *valuation  $p$ -adique de  $n$*  et noté  $v_p(n)$ .

Clairement :  $v_p(n) = v_p(|n|)$ .

**Démonstration** Tout d'abord :  $p^0 | n$ . Ensuite, pour tout  $k \in \mathbb{N}$  pour lequel  $p^k$  divise  $n$  :  $k \leq p^k \leq |n|$ . Conclusion :  $\{k \in \mathbb{N} / p^k | n\}$  est une partie non vide majorée de  $\mathbb{N}$ , donc possède un plus grand élément. ■

**Exemple**  $v_2(60) = 2$ ,  $v_3(60) = 1$ ,  $v_5(60) = 1$  et  $v_p(60) = 0$  pour tout  $p \in \mathbb{P} \setminus \{2, 3, 5\}$ .

**Exemple** Pour tous  $p, q \in \mathbb{P}$  et  $k \in \mathbb{N}$  :  $v_p(q^k) = \begin{cases} k & \text{si : } q = p \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

**Théorème (Additivité des valuations  $p$ -adiques)** Pour tous  $p \in \mathbb{P}$  et  $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  :  $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ .

**Démonstration** Par définition des valuations  $p$ -adiques :  $a = p^{v_p(a)}a'$  et  $b = p^{v_p(b)}b'$  pour certains  $a', b' \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  NON divisibles par  $p$ . En d'autres termes,  $p$  étant premier :  $a' \wedge p = b' \wedge p = 1$ , mais donc :  $(a'b') \wedge p = 1$ , autrement dit  $p$  NE divise PAS  $a'b'$ . L'égalité :  $ab = p^{v_p(a)+v_p(b)}a'b'$  montre finalement alors que :  $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ . ■

Nous avons montré en début de chapitre l'EXISTENCE de la décomposition de tout entier naturel non nul en produit de nombres premiers, nous pouvons enfin en prouver l'UNICITÉ — à l'ordre près des facteurs.

**Théorème (Factorisation première)** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe une et une seule famille presque nulle  $(v_p(n))_{p \in \mathbb{P}}$  d'entiers naturels — i.e. dont tous les éléments sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux — telle que :

$$n = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}. \quad \text{Cette décomposition est appelée la factorisation première de } n.$$

**Explication** Dans la démonstration qui suit, c'est le théorème de Gauss qui nous fournit l'unicité de la factorisation première via l'additivité des valuations  $p$ -adiques. Alors que l'existence était facile à prouver, l'unicité requiert au contraire une certaine artillerie.

**Démonstration** Pour l'unicité, soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(\alpha_p)_{p \in \mathbb{P}}$  une famille presque nulle d'entiers naturels pour laquelle :  $n = \prod_{q \in \mathbb{P}} q^{\alpha_q}$ . Pour tout  $p \in \mathbb{P}$  :  $v_p(n) = v_p\left(\prod_{q \in \mathbb{P}} q^{\alpha_q}\right) = \sum_{q \in \mathbb{P}} v_p(q^{\alpha_q}) = \sum_{q \in \mathbb{P}} \alpha_q v_p(q)$  par additivité des valuations  $p$ -adiques. Cette égalité montre que la famille  $(\alpha_p)_{p \in \mathbb{P}}$  est nécessairement la famille  $(v_p(n))_{p \in \mathbb{P}}$  — donc qu'elle est unique. ■

**Théorème (Divisibilité, PGCD, PPCM et valuations  $p$ -adiques)** Soient  $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

- (i)  $a$  divise  $b$  si et seulement si pour tout  $p \in \mathbb{P}$  :  $v_p(a) \leq v_p(b)$ .
- (ii)  $a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min\{v_p(a), v_p(b)\}}$  et  $a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max\{v_p(a), v_p(b)\}}$ .

**En pratique** Vous utilisez la formule (ii) sur le PPCM depuis fort longtemps quand vous réduisez une somme de fractions d'entiers au même dénominateur. Quel est le plus petit dénominateur commun de  $\frac{13}{12} + \frac{7}{30}$  ? Ce n'est pas  $12 \times 30$  mais  $12 \vee 30$ . Et comme  $12 = 2^2 \times 3$  et  $30 = 2 \times 3 \times 5$  :  $12 \vee 30 = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$ . Bref :  $\frac{13}{12} + \frac{7}{30} = \frac{5 \times 13 + 2 \times 7}{60} = \frac{79}{60}$ .

**Démonstration**

(i) Si :  $a|b$ , disons :  $b = ak$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , alors :  $v_p(b) \stackrel{(i)}{=} v_p(a) + v_p(k) \geq v_p(a)$  pour tout  $p \in \mathbb{P}$ . Inversement, si :  $v_p(a) \leq v_p(b)$  pour tout  $p \in \mathbb{P}$ , alors  $p^{v_p(a)}$  divise  $p^{v_p(b)}$ , donc  $\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a)} = a$  divise  $\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b)} = b$ .

(ii) Pour le PGCD, posons :  $d = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min\{v_p(a), v_p(b)\}}$ . D'après (i),  $d$  divise à la fois  $a$  et  $b$ . Pour montrer que :

$$d = a \wedge b, \quad \text{nous allons prouver que : } \frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1.$$

Soit  $p \in \mathbb{P}$ . Si :  $v_p(a) \leq v_p(b)$ , alors :  $v_p(d) = v_p(a)$  donc :  $v_p\left(\frac{a}{d}\right) = v_p(a) - v_p(d) = 0$ , donc  $p$  ne divise pas  $\frac{a}{d}$ . Si au contraire :  $v_p(a) > v_p(b)$ ,  $p$  ne divise pas  $\frac{b}{d}$ . Dans les deux cas,  $p$  ne divise pas à la fois  $\frac{a}{d}$  et  $\frac{b}{d}$ . En résumé,  $\frac{a}{d}$  et  $\frac{b}{d}$  n'ont aucun diviseur commun premier, donc sont premiers entre eux.

Pour le PPCM, remarquons que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  :  $x + y = \min\{x, y\} + \max\{x, y\}$ . Cette relation est d'un certain point de vue équivalente à la relation :  $ab = (a \wedge b)(a \vee b)$  comme on le voit ci-après :

$$a \vee b = \frac{ab}{a \wedge b} = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a) + v_p(b) - \min\{v_p(a), v_p(b)\}} = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max\{v_p(a), v_p(b)\}}. \quad \blacksquare$$

**Exemple**  $600 \wedge 740 = 20 = 2^2 \times 5$  car :  $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$  et  $740 = 2^2 \times 5 \times 37$ .

**Exemple** Soient  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $p \in \mathbb{P}$ . Alors  $p$  divise  $a$  si et seulement si  $p$  divise  $a^n$ .

**Démonstration** Si  $p$  divise  $a$ ,  $p$  divise  $a^n$ . Les valuations  $p$ -adiques se révèlent utiles pour la réciproque :

$$p \text{ divise } a^n \iff v_p(a^n) \geq 1 \iff n v_p(a) \geq 1 \iff v_p(a) \geq \frac{1}{n} \iff \begin{matrix} \frac{1}{n} > 0 \\ \iff \\ v_p(a) \in \mathbb{N} \end{matrix} v_p(a) \geq 1 \iff p \text{ divise } a.$$

**Exemple**  $\sqrt[5]{\frac{4}{3}}$  est irrationnel.

**Démonstration** Par l'absurde, supposons  $\sqrt[5]{\frac{4}{3}}$  rationnel, disons :  $\sqrt[5]{\frac{4}{3}} = \frac{a}{b}$  pour certains  $a, b \in \mathbb{N}^*$ . Alors :  $3a^5 = 4b^5$ , donc en particulier :  $v_3(3a^5) = v_3(4b^5)$ , ce qui s'écrit aussi :  $5v_3(a) + 1 = 5v_3(b)$ , et modulo 5 :  $1 \equiv 0 [5]$  — contradiction !

### 3.2 PETIT THÉORÈME DE FERMAT

**Théorème (Petit théorème de Fermat)** Pour tous  $p \in \mathbb{P}$  et  $a \in \mathbb{Z}$  :  $a^p \equiv a [p]$ ,  
et si  $a$  n'est pas divisible par  $p$  :  $a^{p-1} \equiv 1 [p]$ .

**Démonstration**

- Pour tout  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$  :  $k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$ , donc  $p$  divise  $k \binom{p}{k}$ . Or  $p$  est premier et :  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ , donc  $p$  est premier avec  $k$ , donc divise  $\binom{p}{k}$  d'après le théorème de Gauss, i.e. :  $\binom{p}{k} \equiv 0 [p]$  ★.
- Montrons à présent par récurrence que pour tout  $a \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$  :  $a^p \equiv a [p]$  — comme on raisonne modulo  $p$ , ce sera alors vrai aussi pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ .  
**Initialisation** :  $0^p = 0 \equiv 0 [p]$ .
- Hérédité** : Soit  $a \in \llbracket 0, p-2 \rrbracket$ . Si  $a^p \equiv a [p]$ , alors :  $(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k \stackrel{\star}{\equiv} \underbrace{a^p}_{k=p} + \underbrace{1}_{k=0} \stackrel{\text{HDR}}{\equiv} a+1 [p]$ .
- Enfin, si  $a$  n'est pas divisible par  $p$ , alors :  $a \wedge p = 1$  car  $p$  est premier. Or  $p$  divise  $a^p - a = a(a^{p-1} - 1)$ , donc d'après le théorème de Gauss,  $p$  divise  $a^{p-1} - 1$ , i.e. :  $a^{p-1} \equiv 1 [p]$ . ■

**Exemple** Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , tout diviseur premier impair de  $n^2 + 1$  est congru à 1 modulo 4.

**Démonstration** Soient  $n \in \mathbb{Z}$  et  $p \in \mathbb{P} \setminus \{2\}$ . On suppose que  $p$  divise  $n^2 + 1$ . Aussitôt :  $n^2 \equiv -1 [p]$  et  $n$  n'est pas divisible par  $p$ . En outre,  $p$  étant impair,  $\frac{p-1}{2}$  est un entier, donc d'après le petit théorème de Fermat :  $1 \equiv n^{p-1} \equiv (n^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} [p]$ . Or :  $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \in \{\pm 1\}$  et  $p \geq 3$ , donc cette congruence est en fait une égalité, autrement dit :  $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ . Comme voulu,  $\frac{p-1}{2}$  est pair, i.e. :  $p \equiv 1 [4]$ .

**Exemple** Il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

Plus généralement, le TRÈS DIFFICILE *théorème de la progression arithmétique* de Dirichlet, démontré vers 1840, affirme que pour tous  $a, b \in \mathbb{N}^*$  premiers entre eux, il existe une infinité de nombres premiers congrus à  $a$  modulo  $b$ .

**Démonstration** Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini  $p_1, \dots, p_r$  de nombres premiers congrus à 1 modulo 4 avec :  $p_1 < \dots < p_r$ , et posons :  $N = (2p_1 \dots p_r)^2 + 1$ . Supérieur ou égal à 2 et impair,  $N$  possède un diviseur premier  $p$  impair, et comme  $p_1, \dots, p_r$  ne divisent pas  $N$ ,  $p$  n'est aucun d'entre eux. Pourtant, d'après l'exemple précédent,  $p$  est lui-même congru à 1 modulo 4 — contradiction.