

### 1 APPRENTISSAGE DE LA SYNTAXE

1 ☉ Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

- 1)  $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3.$
- 2)  $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}.$
- 3)  $\exists x \in \mathbb{R}_+ / x < \sqrt{x}.$
- 4)  $\forall x, x' \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, x \neq x' \implies \frac{x+1}{x-1} \neq \frac{x'+1}{x'-1}.$
- 5)  $\forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N}^* / \sum_{k=1}^n k \geq N.$

2 ☉ Traduire dans un français ÉCLAIRANT les propositions suivantes — i.e. dans un français qui met en évidence le SENS de chaque proposition — puis déterminer sans justifier leur valeur de vérité.

- 1)  $\left\{ \begin{array}{ll} \forall n \in \mathbb{N}, & \exists N \in \mathbb{N} / n \leq N. \\ \exists N \in \mathbb{N} / & \forall n \in \mathbb{N}, n \leq N. \end{array} \right.$
- 2)  $\left\{ \begin{array}{ll} \forall y \in \mathbb{R}_+, & \exists x \in \mathbb{R} / y = e^x. \\ \exists x \in \mathbb{R} / & \forall y \in \mathbb{R}_+, y = e^x. \end{array} \right.$
- 3) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.  
 $\left\{ \begin{array}{ll} \forall x \in \mathbb{R}, & \exists y \in \mathbb{R} / y = f(x). \\ \exists y \in \mathbb{R} / & \forall x \in \mathbb{R}, y = f(x). \end{array} \right.$

3 ☉ Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

- 1)  $f$  est croissante.
- 2)  $f$  prend des valeurs aussi grandes que l'on veut.
- 3)  $f$  possède un minimum.
- 4)  $f$  s'annule au plus une fois.

4 ☉ Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Pour chacune des propositions suivantes, donner graphiquement à main levée un exemple de fonction  $f$  NE la vérifiant PAS.

- 1)  $\exists M \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M.$
- 2)  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0 \implies x \geq 0.$
- 3)  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 1$  ou  $f(x) \leq -1.$

5 ☉ Écrire en langage mathématique les ensembles suivants :

- 1) l'ensemble des entiers naturels divisibles par 7.
- 2) l'ensemble des fractions d'entiers dont le dénominateur est une puissance de 3.
- 3) l'ensemble des entiers qui sont la somme de deux carrés d'entiers.
- 4) l'ensemble des nombres complexes dont les parties réelle et imaginaire sont des entiers relatifs.

### 2 ÉGALITÉ ET INCLUSION D'ENSEMBLES

6 ☉☉ Montrer que :

- 1)  $\{x \in \mathbb{R} / x^4 = 4x - 2\} \subset \mathbb{R}_+.$

$$2) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \exists t \in \mathbb{R} / x = 2t \text{ et } y = t^2 + 1\} \subset \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \leq y\}.$$

$$3) \{z \in \mathbb{C} / |z-1| = |z+1|\} = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) = 0\}.$$

7 ☉☉ On pose :

$$\mathcal{A} = \left\{ \frac{\varepsilon}{k(k+1)} \right\}_{k \in \mathbb{N}^*, \varepsilon \in \{-1, 1\}} \quad \text{et} \quad \mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right\}_{m, n \in \mathbb{N}^*}.$$

Étudier les inclusions :  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$  et :  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .

8 ☉ Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

- 1) Est-il vrai que :  $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$  ?
- 2) Est-il vrai que :  $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$  ?

9 ☉☉ Soient  $E$  un ensemble et  $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ . Montrer que :

- 1)  $\overline{(A \cap B)} \setminus C = (\overline{C} \setminus B) \cup (\overline{A} \setminus C).$
- 2)  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$
- 3)  $A \cup B = B \cap C \iff A \subset B \subset C.$
- 4)  $(E = A \cup B \text{ et } A \cap C \subset B \text{ et } B \cap C \subset A) \implies C \subset A \cap B.$
- 5)  $(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A).$

### 3 RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

10 ☉ On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $u_0 = 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}.$

- 1) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_n \leq 4.$
- 2) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente de limite à préciser.

11 ☉ On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $u_0 = 0, u_1 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$  Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_n = 3^n - 2^n.$

12 ☉ On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $u_0 = 0, u_1 = 0, u_2 = 2$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+3} = 3u_{n+2} - 3u_{n+1} + u_n.$$

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_n = n(n-1).$

13 ☉☉ On note  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $a_0 = 1, a_1 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{a_n}{n+1}.$  Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $1 \leq a_n \leq n^2.$

- 14 ☹☹ Étudier la monotonie de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $u_0 = 0$ ,  $u_1 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+2} = u_n^2 + u_{n+1}^2.$$


---

- 15
- 1) ☹ Déterminer une expression explicite de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $u_0 = 1$  et :
    - a) pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+1} = 1 - u_n$ .
    - b) pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+1} = 2(n+1)u_n$ .
    - c) pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+1} = u_n + 2n$ .
    - d) pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+1} = u_n + n^2 - 1$ .
    - e)  $u_1 = 2$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2}{u_n}$ .
  - 2) ☹☹ Soit  $z \in \mathbb{C}$ . Déterminer une expression de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $u_0 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_n = \begin{cases} u_n^2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ z \times u_{\frac{n-1}{2}}^2 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$
  - 3) ☹☹ Déterminer une expression explicite de la famille  $(z_{i,j})_{i,j \in \mathbb{N}}$  définie pour tous  $i, j \in \mathbb{N}$  par :  $z_{0,j} = 1$  et :
    - a)  $z_{i+1,j} = 2^i j + z_{i,j}$ .
    - b)  $z_{i+1,j} = (i+j) z_{i,j+1}$ .
- 

- 16 ☹☹ Montrer que tout entier supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers — par convention, un nombre premier est le produit d'un seul nombre premier, à savoir lui-même.
- 

- 17 ☹☹ Montrer que tout entier supérieur ou égal à 8 peut être écrit  $3a + 5b$  pour certains  $a, b \in \mathbb{N}$ .
- 

- 18 ☹☹☹ Montrer par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists p, q \in \mathbb{N} / n = 2^p(2q + 1)$ .
- 

- 19 ☹☹☹ Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , toute fonction croissante  $f$  de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  possède un point fixe :  $\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket / f(k) = k$ .
- 

#### 4 RAISONNEMENTS DIVERS

- 20 ☹☹ Montrer que lorsqu'un réel peut être écrit sous la forme  $a + b\sqrt{2}$  avec  $a, b \in \mathbb{Z}$ , les entiers  $a$  et  $b$  sont nécessairement uniques.
- 

- 21 ☹☹☹ En s'aidant du nombre  $\sqrt{2}$ , montrer que :  $\exists x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} / x^y \in \mathbb{Q}$ .
- 

- 22 ☹☹ Montrer par analyse-synthèse que toute fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  est la somme, d'une unique façon, d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
- 

- 23 ☹☹☹ On cherche toutes les *isométries de  $\mathbb{R}$* , i.e. toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  :  $|f(x) - f(y)| = |x - y|$ .
- 1) **Analyse** : Soit  $f$  une isométrie. On note  $\delta$  la fonction  $x \mapsto f(x) - f(0)$  sur  $\mathbb{R}$ .
    - a) Montrer, en étudiant la quantité  $(f(x) - f(y))^2$ , que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  :  $\delta(x)\delta(y) = xy$ .
    - b) En déduire la forme de  $f$ .
  - 2) **Synthèse** : Conclure.
- 

- 24 ☹☹☹
- 1) Déterminer par analyse-synthèse toutes les fonctions  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telles que pour tous  $m, n \in \mathbb{N}$  :  $f(m+n) = f(m)f(n)$ .
  - 2) Déterminer par analyse-synthèse toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  :  $f(x+y) = f(x) + f(y)$ .
-